

竹林寺女科秘傳

序

是書舊傳爲仙授荒誕殆不足信顧如其方試之皆奇
驗初惟竹林寺僧人有之秘而不以示人迺辯才蘭亭
竟爲蕭翼賺去母亦豐城龍劒神物不欲終藏也乎惜
其中譌誤過多又第五十六症及八十二症但具標題
鈔錄未完云被寺僧驚覺奪去不免猶有遺美然亦足
見竊錄者用心爲良苦而其得而錄之亦良不易易矣
書之鈔本旣少得者亦遂什襲藏之以視中郎枕中物
不啻也歲甲午春余於友人處偶得是本如獲異寶

竭三刻之力亟錄一過繼乃念區區寫本不能如水火
至足得給衆人昏暮之求且虞輪轉日久或萎芟者攘
而私之則羚羊挂角終必無跡可尋久思捐貲刊行乃
以囊篋不果遲之者幾二十年頃 李刺史春帆先生
見之深以是書爲濟世良方遂慨然爲已任分鶴料以
付剞劂氏從此廣爲散布俾人人各持一卷庶荒邨僻
邑家有其書不復慮醫之難投而厥疾之不瘳也將是
書之有功於人者良多而 先生之有功於人世者豈淺鮮哉
咸豐二年八月浚儀常茂秋厓述於小有補齋

竹林寺文科秘傳計一百十一

後附七十一

第一症

月經趕前 此症經來時色

小腹俱疼面色黃瘦不思飲食乃血虧氣虛先用

黃芩散退其煩熱後用調經丸補其虧損次月即愈

黃芩散

黃芩 陸分 川芎 捌分 當歸 白芍 蒼朮 各壹錢

知母 花粉 各柒分 甘草 叁分 水煎服

調經丸

三稜

莪朮

當歸

白芍

生地

熟地

元胡

白茯苓

各壹兩

川芎

大茴香

小茴香

烏藥

各捌錢

米糊爲丸不拘時酒送下

第二症

月經趕後 此症經來如漏水頭目昏暗小腹作痛
小便時兼白帶喉中臭如魚腥惡心吐逆先服理經
四物湯後用內補當歸九次月卽愈

理經四物湯

當歸

川芎

生地

柴胡

白朮

香附

元胡

各壹錢

白芍

黃芩

三稜

各捌分

水煎臨臥服

內補當歸丸

當歸

續斷

白芷

阿膠

厚朴

茯苓

茯苓

蒲黃

炒黑

黃肉

各壹兩

川芎

熟地

各壹兩伍錢

製附子

參錢

乾薑

甘草

各伍錢

煉蜜爲丸如桐子大空心酒下八十九

第三症

月經或前或後 此症因脾土太弱不思飲食漸致
血衰經水或先或後不須理血只宜調脾脾土健則
血旺氣勻自然應期而至矣宜服紫金丸

紫金丸

陳皮

伍錢

良薑

莪朮

烏藥

各捌錢

枳櫚

砂仁

紫荳蔻

各陸分

三稜

壹兩

米糊爲丸食後米湯送百丸

第四症

血虛發熱

此症因婦人性急或行經時房事觸傷脇

內結塊如雞子大左右兩脇作痛月水不行以致五
心發熱頭昏目暗咳嗽生痰先用逍遙散止其熱次
用紫菀湯止其嗽若遲久不治則成泄瀉百死無生矣
逍遙散

當歸

白朮

炒

白芍

炒

柴胡

各壹錢

花粉

八分

黃芩

陸分

地骨皮

石蓮肉

各壹錢

薄荷

肆分

甘草

伍分

水煎空心服

紫菀湯

杏仁

去皮尖壹錢伍分

阿膠

炒研沖服捌分

桑白皮

蜜炙壹錢

五味子

伍分

知母炒壹錢川貝母去心捌分款冬花去梗陸分紫苑桔梗

蘇子各捌分水煎臨臥服

第五症

經閉發熱 此症或行經時或產後多食生冷及手

着冷水蓋血見冷則凝滯初起月餘乍寒乍熱五心

煩燥若遲延不治變作骨蒸午後潮熱肌膚憔悴泄

瀉不止百無一生矣如病重者用鴉片三釐甘草湯

服之有救死回生之妙逍遙散紫苑湯亦可用之二

方詳前第四症

第六症

行經氣虛作痛 此症經來一半血尙未盡腹中作

痛內外發熱須用紅花散破其餘血則熱退痛止矣

紅花散

枳壳

陸分

紅花

牛膝

當歸

蘇木

各壹錢

赤芍

三稜

莪朮

各捌分

川芎

伍分

水

煎空心服

第七症

經來不止 經來十餘日不止乃妄行也當審此婦

會吃椒薑等一切熱物過度否是爲實症須用金狗散

金狗散

續斷

金毛狗脊

炒

地榆

當歸

白芷

黃芩

各壹錢

川芎

白芍

各捌分

熟地貳錢

水煎空心服

第八症

經來如黃水

此是虛症用藥不可太涼務要煖經

補血用加味四物湯則血盛而愈矣

加味四物湯

當歸

川芎

烏藥

元胡

各壹錢

白芍

小茴香

各捌分
熟地貳錢

棗三枚薑三片水煎空心服

第九症

經來如綠水

此症全無血色乃氣虛太寒不可用

涼藥須用烏雞丸服之不但病愈兼能受孕

烏雞丸

天雄附子

叁錢

鹿茸

山藥

茯苓

蒲黃

炒黑

肉桂

當歸

山萸

白芍

各壹兩

川芎

壹兩伍錢

烏雞肉去皮油酒蒸三兩米糊爲丸空心黃酒

下一百丸卽愈

第十症

經來全白水

此症五心煩熱小腹作痛面色青黃

乃氣血虛弱亦用烏雞丸照前服之其效如神方詳

前第九症

第十一症

經來紫黑成塊又如葱白色頭目昏暗兼白帶亦虛症也急用內補當歸丸服之立效詳前第二症

第十二症

經來臭如夏月之腐此乃血虧之症更兼多食熱物以致身衰體弱新舊之血不接譬如溝渠水涸天久不雨則臭甚也宜用龍骨丸

龍骨丸

龍骨

海鯨蛸

牡蠣

生地

各壹錢

當歸

川芎

白芍

茯苓

各捌分

黃芩

陸分

蜜丸空心酒下百丸另服煎藥方開後

當歸

三稜

莪朮

赤芍

丹皮

白朮

香附

條芩

陳皮

木通

各捌分

薑一片水煎服

第十三症

經來不止如魚腦腳疼不能走動乃下元虛冷兼風邪所攻宜和血行氣須用疎風止痛散

疎風止痛散

當歸

天麻

僵蠶

烏藥

牛膝

獨活

石南藤

乳香

紫槿花

骨碎補各

錢川芎伍分

薑三片葱白三寸水煎成加黃酒一杯空心服

第十四症

經來如牛膜皮 此症經來不止如下膜色一般昏迷倒地乃血氣變結而成雖危無妨用硃砂丸立效

硃砂丸

硃砂貳錢 白茯苓壹兩

水爲丸薑湯送五十粒

第十五症

經來下血胞 經來不止或下血胞三四個如雞卵
子大假使絮刀割開內如石榴子狀其婦昏迷不知
人事雖危不妨宜用十全大補湯

十全大補湯

當歸

白朮

各壹錢

川芎

白芍

人參

茯苓

黃芪

生地

各捌分

肉桂

伍分

炙草

伍分

薑三片棗二枚水煎空心服三五劑立效

第十六症

經來小便痛如刀割 此乃血門不開可用八珍散
如不效者用牛膝湯立效

牛膝湯

上牛膝 叁錢 乳香 壹錢

水鍾半煎牛膝一鍾服時磨乳香麝香投入藥
內空心服之即愈如係大症可用硃砂丸詳前

第十四症

第十七症

經來時有筋掣吊陰痛不可忍 此症第一條從陰

吊起乳亦疼痛身上發熱宜服川棟湯

川棟湯

川棟子

猪苓

澤瀉

白朮

小茴香

大茴香

烏藥

元胡

乳香

各壹錢

木香

分

麻黃

陸分

枳榔

捌分

薑二片葱一科水煎服發汗二劑即愈

第十八症

經來未盡潮熱氣痛

此症經來一半忽覺口渴小

腹疼痛因食生冷血滯不行有瘀血在內不可用補

宜用清涼之劑熱退則經盡痛止矣莪朮散宜之

莪朮散

三稜

紅花

牛膝

蘇子

莪朮

各壹錢

水煎空心服

第十九症

經來已盡作痛 此症手足麻木及腹內虛冷蓋氣血衰甚也宜服人參四物湯

人參四物湯

人參

歸身

白芍

各壹錢 川芎捌分

薑棗煎服

第二十症

經來小腹結成一塊如皂角一條橫梗痛不可忍不思飲食面色青黃急服元胡散

元胡散

元胡 肆錢 髮灰 叁錢

共爲末酒調下服之半月其塊自消

第二十一症

經來脇氣疼 經來脇內一塊如杯大其血淡黃色

急宜治塊先用四物元胡湯

四物元胡湯

當歸

川芎

白芍

元胡

各捌分 熟地壹錢伍分

薑三片酒煎加沉香叁分食後服再用當歸川芎白芍元胡各四兩沉香叁錢分作四帖酒煎服或爲末用酒送下亦可

第二十二症

經來遍身疼痛 此症乃寒邪入骨或熱或不熱急宜解表須用烏藥順氣湯

烏藥順氣湯

烏藥

殭蠶

白芷

陳皮

枳壳

各搗分

乾薑

甘草

各伍分

麻黃

去節肆分

薑三片葱一科水煎服發汗即愈

第二十三症

觸經傷寒

經來悞食生冷遍身潮熱痰氣緊滿惡

寒四肢厥冷急服五積散

五積散

厚朴

陳皮

桔梗

白芷

白茯苓

枳壳

各捌分

半夏

香附

各壹錢

蒼朮

柴胡

各肆分

川芎

乾薑

各伍分

青皮

陸分

當歸

壹錢

薑三片葱一科水煎服

第二十四症

逆經上行 經從口鼻而出此因過食椒薑熱毒之

物其血亂行急服犀角黃連湯

犀角黃連湯

犀角

白芍

丹皮

枳實

生地

各貳錢

百草霜

黃芩

橘紅

桔梗

各捌分

甘草

貳分

水煎空心服數劑立效

第二十五症

經從口鼻出咳嗽氣緊不住五心煩熱宜推血下行
常用紅花散和血次用冬花散止嗽不須多服別藥
熱去自安

紅花散

紅花

黃芩

蘇木

各捌分花粉陸分

水煎空心服

冬花散

米壳

蜜炙桔梗

枳實

蘇子

紫苑

知母

冬花蕊

各捌分

桑皮

炒

杏仁

石膏

各壹錢

水煎服

第二十六症

逐日經來

此症經來日有幾點則止過數日又來

幾點一月三四次面色青黃先用艾膠湯後服紫金

丸即愈

艾膠湯

川芎

捌錢

熟地

壹錢

阿膠

炒各叁錢

薑三片棗二枚水煎空心服紫金丸詳第三症

第二十七症

經來狂言如見鬼神 此症經來或因怒氣觸阻逆

血攻心不知人事狂言鬼語先用麝香散安心定志

後服茯神丸即愈

麝香散

辰砂

麝香

甘草

各叁分

木香

伍分

人參

桔梗

柴胡

茯苓

各捌分

遠志

去心壹錢

水煎不拘時服

扶神丸

茯神

遠志

茯苓

硃砂

各捌錢

猪心一個棗米糊爲丸金器煮湯送下五十丸

第二十八症

經來嘔吐不思飲食宜用丁香散

丁香散

丁香

乾薑各伍分

白朮

貳錢

共爲末每早米湯送下三茶匙

第二十九症

經來飲食後即嘔吐 此症乃痰在胃中阻住水穀
不能入胃宜投烏梅散化去痰涎後用九仙奪命丹

烏梅散 一名烏梅丸

木香 雄黃各叁錢 草果壹個 乳香 沒藥各貳錢

烏梅肉爲丸如彈子大每早含化一九

九仙奪命丹

草果壹個 荳蔻壹個 厚朴 茯苓各貳錢 蒼朮

枳壳 木香 山查 陳皮各壹錢

共爲末薑湯下此方不拘婦女經症即男子患

噎膈水穀不下先服烏梅丸後用九仙奪命丹
其效無比

第三十症

經來遍身浮腫 此因脾虛不能尅水變而爲腫宜

用木香調胃散

木香調胃散

木香

甘草

各叁分

陳皮

紅花

各伍分

莢朮

木通

山查

大腹皮

各捌分

砂仁

蒼朮

各陸分

萆薢

叁分

薑三片水煎空心服

第三十一症

經來泄瀉 經行之時五更泄瀉如乳兒屎此乃腎
胃虛寒不必治脾服三五劑調中湯即愈

調中湯

人參

白朮 各捌分

五味子

甘草 各叁分

乾薑 伍分

薑三片水煎空心服

第三十二症

經來大小便俱出 此名錯經因食物過多積久而
成須去其熱毒調其陰陽即安宜服分利五苓散

分利五苓散

猪苓

澤瀉

白朮

各錢

阿膠

川芎

當歸

各捌分

赤茯苓

壹錢

水煎空心服

第三十三症

婦人白帶

白槿花煎老酒服之即愈

第三十四症

經來常咳嗽

此病喉中出血乃肺金枯燥急止其

嗽再除其根先服茯苓湯後用雞蘇丸

茯苓湯

茯苓

川芎

蘇葉

前胡

半夏

桔梗

枳實

陳皮

乾薑

各捌分

人參

伍分

可少

桑皮

陸分

甘草

叁分

薑三片水煎空心服

雞蘇丸

蘿蔔子

伍錢

川貝母

肆兩

蜜丸梧子大空心白滾湯送五十丸

第三十五症

經來服大如鼓

此壯月水不行二三月以至七八

月腹大如鼓人以爲孕一日崩下血來其血泡有物如蝦蟆子病婦昏迷不知人事體瘦者不治體壯者只服十全大補湯詳前第十五症

第三十六症

經來小便如白蟲 此症經來時血內有白蟲如雞腸色滿腹疼痛推蟲於大便出之則無事矣宜用追蟲丸

追蟲丸

續隨子

檳榔

牽牛

大戟

麝香

各伍

分甘遂

芫花

各壹錢

米糊丸酒下十丸再服建中丸神效

建中丸

黃芪

蜜炙

肉桂

甘草

各伍錢

白芍

壹兩

共爲末白湯下

第三十七症

經來潮熱十日不思飲食 此胃氣不開之故也宜

取老鴨頭頂上血調酒飲之立效須用雄鴨

第三十八症

室女經閉 女子月水初行或用冷水洗手足則凝滯不出血海面色青黃遍身浮腫作水腫治不效宜用通經丸通其積血其腫自消

通經丸

三稜

莪朮

赤芍

川芎

當歸

紫苑

劉寄奴各捌分 穿山甲 壹片

米糊丸酒送下

第三十九症

血山崩

此症初起時宜用十灰丸若久崩者乃虛



弱故也宜用雞子湯若小腹疼痛再用加味四物湯

十灰丸

阿膠 伍錢 側柏葉 棕櫚 蘼艾 各壹錢 綿絹 壹團

苧根 百草霜 各壹錢 白茅根 壹根 頭髮 壹團

各燒灰存性爲末白湯送下

雞子湯

雞脊內的子慈參科薑壹兩共搗如泥用麻油入鍋內同炒去渣黃酒熱服加味四物湯詳第八症

第四十症

經來吐衄蟲 此症經來時寒熱往來四肢厥冷大
汗吐蟲痰氣緊滿百死無生

第四十一症

胎前惡阻 此症胎前吐逆不思飲食腹中作痛乃
胎前氣不和之故宜用和氣散

和氣散

陳皮 桔梗 厚朴 小茴香 益智

藿香 各捌分 丁香 甘草 各叁分 木香 砂仁 各伍分

蒼朮 肆分 水煎服一劑即安

第四十二症

胎前潮熱氣痛 此受熱毒之故宜用五苓散

五苓散

赤苓

猪苓

澤瀉

白朮

各捌分

水煎服二三劑即愈

第四十三症

胎前寒熱往來是爲瘧疾 小腹作痛口燥舌乾乃受熱過多又傷生冷陰陽不和宜用草菓飲

草菓飲

草藁壹個 青皮

柴胡

黃芩各捌分 甘草叁分

水煎空心服即安

第四十四症

子在腹頂心不知人事 此過食椒薑雞肉熱毒等物所致或六月蓋綿被受熱而子高至心亂動不安先用調中和氣散後服勝紅丸

調中和氣散

大黃

石膏各壹錢 枳榔

枳殼

知母各捌分

黃連陸分 柴胡叁分 黃柏伍分

水煎空心服

勝紅丸

巴豆 去壳油十粒 百草霜

米糊丸白湯送下七丸子母俱安

第四十五症

胎前氣緊不得卧 此症過食生冷兼有風寒感冒
肺金生痰先用紫蘓湯後服安胎散

紫蘓湯

蘓葉 桔梗 枳實 大腹皮 貝母

知母 當歸 桑皮 各捌分 五味子 石膏

甘草

各叁分

水煎服

安胎散

阿膠

茯苓

當歸

人參

生地

各壹錢

小茴香

大茴香

各捌分

川芎

甘草

各伍分

水煎空心服

第四十六症

胎前咳嗽

此因多食生冷又食椒薑所傷胎熱火

勝方作此疾用五虎湯立效

五虎湯

杏仁

石膏

枳實

各壹錢

蘇子

陳皮

知母

桔梗

各捌分

麻黃

肆分

甘草

叁分

水煎溫服卽安咳嗽卽止

第四十七症

胎前衄血常從口鼻中來 此是傷熱血熱亂行冲

傷胞絡宜用涼胎之藥不可用四物湯宜用衄血立

效散

衄血立效散

丹皮

黃芩

白芍

側柏葉

各捌分

米糊丸白湯下

第四十八症

胎前瀉痢 此食椒薑雞肉等物入脾大腸火燥變而成痢也初起三日用甘連湯立效如瀉久孕婦形瘦精神短少者子母兩亡不能治也

甘連湯

甘草 伍分 川連 貳錢
炒 乾薑 壹錢

水煎服

第四十九症

胎前漏血 有孕紅來如經行應期一至此是胎漏

宜用小烏金丸其效如神

小烏金丸

海金砂

叁錢煅

姜蠶

側柏葉

小茴香

百草霜

川芎

各伍錢

蒼朮

肆錢

防風

當歸

各捌錢

錢

厚朴

陸錢

棗米糊爲丸白湯送下一百丸

第五十症

胎前白帶

此乃胎氣虛弱先用扁豆花微炒沖酒

服之後用閉白丸

閉白丸

龍骨

海鯨硝

牡蠣

赤石脂

各伍錢

米糊丸酒下百丸

第五十一症

胎前赤帶 漏紅如猪血日夜不止精神短少急用

側柏葉丸卽止

側柏葉丸

側柏葉

黃芩

各肆兩

煉蜜爲丸白滾湯下百丸

第五十二症

胎前氣緊咳嗽 凡氣緊動紅久嗽不止其紅每月應期而來日午心熱氣緊人皆作癆治之不效先用逍遙散退熱後用紫苑湯止嗽二方詳前第四症

第五十三症

胎前動紅 此因飲食損傷惡血破來如水不止急用艾膠湯止血再用安胎散固胎體壯者三五劑卽愈弱者不治

艾膠湯

川芎

捌分 熟地

阿膠

各壹錢炒

艾葉 貳錢 棗 叁枚

水煎空心服

安胎散詳前第四十五症

第五十四症

胎前小便不通 此症名爲轉脾急用車前八珍散

如不效再服八味丸卽效

車前八珍散

車前 壹錢 白朮 土炒 白茯苓 當歸 川芎 各

錢 人參 白芍 各壹錢 炙甘草 捌分 熟地 壹錢

水煎服

八味丸

附子

山萸

丹皮

澤瀉

各捌

山藥

各錢

茯苓

叁錢

肉桂

伍分

甘草

叁分

米湯爲丸亦可接入味內少熟地

第五十五症

胎前小產

懷孕未足而生皆曰小產若不調治恐

再孕復然須服益母丸方保無碍

益母丸

益母草

當歸

各肆兩

煉蜜爲丸空心白溫下

第五十六症

抄錄未完

第五十七症

胎前怔忡 心常恍惚遍身發熱乃血氣虛弱時受胎之故也宜用硃砂湯服之神效

硃砂湯

不落水猪心一個水煎湯一鍾研硃砂一錢調服

第五十八症

胎前服脹

此因氣血虛弱切忌通利之藥以致傷

胎宜用大腹湯

大腹湯

大腹皮 五加皮 青皮

薑皮

陳皮
各壹錢

水煎服

第五十九症

胎前遍體酸困 此症面色黃瘦不能飲食精神疲

倦形容憔悴因血少不勝難養胎元宜用四物湯立

效

四物湯

當歸

川芎

各壹錢

熟地

貳錢

白芍

捌分

水煎服

第六十症

胎前陰門腫

此乃胎不運動而致宜用順氣散即

愈

順氣散

訶子 壹個

水煎溫服

第六十一症

胎前下血動胎

婦人壯者三五日內急以安胎散

救之若形瘦而冷汗面色如灰四肢無力乃積久之病神色已去不必治矣安胎散詳前第四十五症

第六十二症

胎前脚疼 此乃血氣虛弱下元更虛又兼風邪宜用止血行氣之劑須用烏梅順氣散詳前第二十二症

第六十三症

胎前中風 牙關緊閉痰氣壅盛不知人事此症因食生冷兼坐風中而致先用黃蠟膏後服排風散

黃蠟膏

枯礬

黃蠟

麻黃

各等分爲末共鎔化擦牙

排風散

麻黃

肆兩

白朮

防風

甘草

川芎

當歸

茯苓

白蘚皮

獨活

各捌分

薑三片棗二枚水煎服

第六十四症

胎前癰瘕

此症手足不能動乃胃腕有痰凝住血

氣而致宜用烏藥順氣散詳前第二十二症

第六十五症

胎前腰疼 此乃血去廕胎不能養腎腎水不足所致用猪腎丸神效

猪腎丸

猪腰 貳個 青鹽 肆錢

入腰子內蒸熟焙乾爲末蜜丸空心酒服

第六十六症

胎前頭疼 此乃寒邪入腦陽氣衰也宜用芎芷湯

三劑即愈

芎芷湯

川芎

菊花

白芷

石膏

白芍

藁本

茯苓

各捌分
甘草伍分

薑三片煎服如不止加細辛原有頭疾病不能

速效

第六十七症

胎前泄瀉

此症隨四時治之再宜隨病斟酌春宜

服平胃散夏秋冬可類推矣

平胃散

茯苓

炙甘草

山藥

廣皮各等分

夏宜服六和湯秋宜服香薷氣湯冬宜服理

中湯

第六十八症

胎前心疼不可忍 此是胎氣不順宜用順氣散即

能止疼

順氣散

草菓壹個

元明捌分

五靈脂壹錢

沒藥捌分

酒煎半飢時服

第六十九症

胎前忽然倒地 此孕婦精神短少承胎不住以致
目花眼昏一時倒地不須服藥只飲食補之可也

第七十症

胎前大便虛急 此症蓋脾土燥大腸澀只宜理脾
通大腸不可用硝黃下之宜服枳實湯即效

枳實湯

枳實貳兩

水二鍾煎七分不拘時服

第七十一症

胎前遍體癢癢成風痺 此症有風不可服藥只用
樟腦酒洗之

第七十二症

胎前陰戶甚癢 此受孕後房事不節陽精留蓄因
而作癢用川椒白芷湯洗服即止

川椒白芷湯

川椒

壹兩

白芷

壹兩

伍錢

水煎服渣再煎洗之

第七十三症

胎前乳腫 此症兩乳腫疼作寒作熱名曰內吹用
皂角一條燒灰存性黃酒送下立消不再發矣

第七十四症

胎前喉疼 此乃寒攻下喉胃有痰涎宜去寒化痰
爲先用升麻桔梗湯二三劑卽安

升麻桔梗湯

升麻

桔梗

甘草

各捌分

防風

元參

各壹分

水煎服

第七十五症

胎前消渴 此乃血少三焦火熾而然宜用生四物湯加生地川黃柏或六味丸自愈

第七十六症

胎前耳鳴 此乃腎虛宜用猪腎丸詳前第六十五症

第七十七症

胎前不降生 臨產水乾孩子不下可用益母散生其水水至胎下若閉不生者死

益母散

麝香 壹分 白芷

滑石 各壹錢 肉桂 捌分 益母草 叁錢

水煎服

第七十八症

秘傳難產奇方 用高牆上蛇蛻一條要頭向下者
佳瓦上焙乾爲末壹錢加麝香叁分乳調爲膏貼臍
上卽產速去切不可久貼

第七十九症

胎衣不下 此症多因身弱血少水乾而然宜用川歸
湯衣在胸膈者難治在小腹者用破靈丹卽愈若婦

人面色青黃口舌黑指甲青此子已死腹中當用朝
爛散打下死胎急救其母若面色青黃指甲紅色其
子猶生不可輕用

川歸湯

川芎貳錢 當歸壹錢 益母草貳錢

取汁和老酒煎服立下

破靈丹

紅花壹兩 蘇木伍錢

黃酒煎服

朝爛散

當歸伍錢 川芎肆錢 益母草陸錢 朴硝叁錢

水煎服

第八十症

產后血氣痛 此乃餘血不盡腹中作痛遍身發熱
惡漏在腹當去其血熱自退矣宜用紅花散詳前第
六症

第八十一症

產后惡露已盡腹仍作痛 此乃腹中虛痛若有潮
亦是虛潮宜用四物湯加烏藥小茴乳香沒藥五靈

脂

第八十二症

產后惡寒發熱 此乃內傷外感之症此方因寺僧

驚覺奪去抄錄未全

此方用當歸黑芥穗
卽效且可隨時加減

第八十三症

產后咳嗽 此乃產后傷風變爲咳嗽宜用小青龍

丹卽愈

小青龍丹

甘草

乾薑各伍分

五味子叁分

杏仁錢伍分

半夏壹錢

薑三片水煎服

第八十四症

產后子宮突出 用鯉魚燒灰存性調清油擦之即愈

第八十五症

產后痕疽突出 先用連翹散後用黃蠟膏立效

連翹散

連翹

炙黃芪

花粉

防風

梔子各壹

錢甘草

伍分

水煎服

黃蠟膏詳前第六十三症

第八十六症

產后一月惡露重來不止昏迷倒地不知人事 此
乃生產一月夫婦交媾搖動骨節以致血崩急用金
狗散立效詳前第七症

第八十七症

產后氣急成泄瀉氣緊不止煩熱口渴 此乃內虛
外熱必死之症

第八十八症

產后舌黑如塵口乾絕無津液 此乃腎敗必死之症

第八十九症

產后譫語又水瀉 此乃惡血攻心上盛下虛必死之症

第九十症

產后弔陰 產后脰腫俱在調經門第十七症

第九十一症

產后脾腫 詳前第三十症

第九十二症

難產丹方 用雄老鼠腎一對加麝香二分搗爛分作三丸上好硃砂爲衣白湯送下一丸男左女右手
中捻出若死胎頭上頂出也屢試屢驗此丹清水洗
淨尙用一次

第九十三症

產后血氣痛 益母草 壹兩 全當歸 伍錢 紅糖

水煎服凡產后服一劑永保無虞

第九十四症

難產方 伏龍肝 伍錢 卽鍋膀下之土塊用酒冲服
其胎立下不能飲酒以白滾水送之

第九十五症

難產及子死腹中 此方名龍虎散

龍虎散

敗龜板 壹個醋炙 蛇退 貳條頭尾俱全 蟬退 十八個

全新瓦 婦人亂髮 壹團皂角水洗 滑石 貳錢水
焙乾 去油火煨存性 飛過

共研細末磁罐收貯用黃蠟封固每服貳錢老
酒送下不飲酒者白滾湯送下立產用益母草

煎湯更佳

第九十六症

產后百病仙方

熟地

肆錢

白芍

錢半

白朮

壹錢

白茯苓

貳錢

麥冬

貳錢

去心杜仲

貳錢

續斷

錢半

益母草

捌分

牛膝

貳錢

薑灰

陸分

蓮子

拾粒

去心

燈心

壹團

水煎服

第九十七症

難產或橫生或血海乾涸以致死孩不下急用皮硝

貳錢產婦壯者用叁錢如寒天加附子三五分用好

酒半鍾童便半鍾入硝煎一二沸溫服立下百發百中

又方 歸尾 貳錢 苦參 貳錢 百草霜 錢半 牛膝 貳錢

細磁屑 叁分 水一鍾煎半鍾熱服亦可

第九十八症

產后惡露不盡或胎衣不下腹中血塊凝滯作痛急用錦文大黃壹兩爲末好錯三斤同熬成膏丸梧子大每服五丸溫醋送下

第九十九症

產后三日牙關緊閉二目直視四肢厥冷急用乾薑
伍錢炒黑水煎入童便溫服立效

第一百症

產后乳汁不通宜服湧泉湯即通

湧泉湯

當歸 捌錢 川芎 貳錢 木通 叁錢 通草 貳錢 穿山甲 壹錢

土王不留行 壹兩 生麥冬 去心 五花龍骨

瞿麥穗 各壹錢

共爲細末每服壹錢熱黃酒調下再用猪前蹄

一二隻煮熟湯飲之並猪蹄亦可食之不宜用鹽

第一百一症

產后心悶不知人事 羚羊角燒灰以東流水調服

一匙卽安

第一百二症

產后陰門腫痛 蛇麻子貳兩水煎頻洗腫消痛止

第一百三症

產后陰門痛極不可忍 桃花泡去皮尖炙極焦存性

研末塗之痛立止

第一百四症

產后陰門癢極不可忍

花椒麝食鹽

伍錢

生白礬

壹錢

共研末糝上癢卽止

第一百五症

產后血枯陰門生瘡癢不可忍

雄猪肝

壹斤

白水煮

熟照陰門之大小濶狹切片糝杏仁末

壹分

花椒末

壹分

白礬末

壹分

用綿線一條串入猪肝內按入陰

戶過一宿其蟲死其瘡卽愈

第一百六症

產后大便不通氣急坐臥不安 麥芽爲末酒一鍾
調服卽通

第一百七症

產后大小便不通 急用熟地壹兩水煎服立通或
飲牛乳二三日亦通

第一百八症

產后口渴 蓮子心研末滾水調服貳錢卽解

第一百九症

產后兒枕痛 乃惡血凝滯之故用山楂壹錢煎湯

入黑糖伍錢服之痛立止

第一百十症

婦人血崩方

熟地

伍錢

當歸

壹錢

白芍

阿膠

蛤粉炒

地榆

各貳錢

荆芥穗

壹錢

川芎

伍分

水一碗煎七分空心服

第一百十一症

產后血暈不省人事眼黑耳鳴口吐涎沫手足痠癢

當歸

叁錢

川芎

貳錢

荆芥穗

壹錢

水煎

加童便一

茶鍾不拘時溫服卽安

以前一百一十一症

以后七十二方

計開七十二方

保胎無憂散

兔絲子

錢半

川貝母

錢半 去心

當歸

錢半 酒洗

川芎

貳錢

白芍

冬日壹錢伍分

陳荊芥穗

嫩黃芪

各捌分炙

紫厚朴

黃錢

枳壳

陸分

甘草

蘼艾葉

柒分

羌活

伍分

生薑三片水煎服

右方專治素有難產之患如懷孕至八月服一劑九月再服一劑臨月先期又服二三劑令產時不疼不痛易于生育如遇難產者照前藥煎服卽下 又臨產時令產婦口念語敬忘遺四字易生無死

本寂禪師催生方歌

四兩麻油一兩糖卽蜜銀器煎湯產婦嘗如無銀器

用磁器入銀五錢煎便良更加一盃酒在內免碍子

母見閭王

難產方

酒釀

麻油

蜂蜜

童便

各壹鍾

和勻溫服卽生

橫生逆產方

知母

真茅山蒼朮

橫切生薑

順切不效
各貳錢伍分

俱要秤準白水煎服難產者服之快生逆者服之順下其效如神

死胎不下方

猪板油

蜜酒

煎一碗熱服卽下亦治胞衣不下

產后閉目不語方

生白礬爲末每服貳錢滾水和服

產后血氣痛方

取端午所收白蘿蔔煎湯和紅花熱服

產后大小便不通

服牛乳一日稍通三日卽愈人乳尤妙

產后血塊疼痛精神恍惚方

大黃

各兩醋炙晒乾

血竭

伍錢

桃仁

紅花

各伍錢

酒糊爲丸辰砂爲衣空心下七十九

乳脂不回方

神麴炒焦黃色 研細末酒服貳錢極效

調經丸 專治月水遲早不調臨經骨痛腰痛經後白

淋人弱無力服一二月即愈兼可受孕

大熟地人乳九蒸九晒 白茯苓人乳浸透 全當歸酒洗

切片 白川芎酒洗切 四製香附鹽水童便薑汁 魁白

芍參兩 延胡索貳兩 破故紙鹽水炒 陳莢肉去支淨

嫩黃芪蜜炙 杜仲鹽水炒 巨勝子鹽水炒 川斷續肉

去芦淨 焦於朮土炒 炮薑炒成炭 核桃肉去油

共爲細末白蜜爲丸如桐子大每早用淡鹽湯服叁錢或伍錢如小肚覺冷且疼痛加小茴香

炒焦壹兩

調經湯藥方 專治行經肚痛腰痛經水遲早不調將

行經之時可服四劑

大生地

切片酒炒伍錢

白歸身

叁錢

川芎

壹錢伍分

粉丹皮

貳錢

蘇丹參

叁錢

製香附

叁錢

元胡

貳錢

杜仲

鹽水炒叁錢

破故紙

鹽水炒叁錢

澤蘭葉

壹錢伍分

赤芍

叁錢

炮薑

伍分

荷葉壹錢爲引服藥用核桃肉過

安胎散 專治受孕三四月見紅漏胎及肚痛腰痛白

淋白帶人倦胃口不開惡心飽悶

大熟地

人乳拌九蒸晒兩

大生地

酒洗切片佳兩

焦於朮

土炒兩 白茯苓

神人乳浸晒

杜仲

鹽水炒兩

川斷肉

去芦兩

懷山藥

蓮鬚

貳兩

炒梔子

參兩

魁白芍

參兩

嫩黃芪

蜜炙兩

麥冬

去心兩

壳砂仁

炒帶壳研末兩

元參

去芦兩

黃芩

阿膠

蛤粉炒成珠兩

淨棗仁

炒焦兩

共為末白蜜為丸如桐子大每早晚用開水送

下三錢至伍錢為準

安胎煎藥方 此方一受孕可服每月服五劑永無小產之患

大生地 陸錢 焦子朮 貳錢 條芩 貳錢 懷山藥 叁錢

杜仲 參錢 川斷 貳錢 蓮鬚 叁錢 梔子 參錢 魁白芍 叁錢

嫩黃芪 參錢 白茯苓 叁錢

引加藕節叁枚用核桃肉過如受孕三四月內
內熱心煩肚痛去炒梔子加真川連五分另煎
投服

順胎散 專治有孕足月恐有難產可先服三四劑臨

產最易

大生地 伍錢 赤芍 叁錢 香附 叁錢 元胡 貳錢 丹參 叁錢

當歸 叁錢 川芎 錢半 木通 錢半 滑石 貳錢 飛淨

引加芝蔴 叁錢 如若難產交骨不開可加覆盆

子 叁錢 皮硝 壹錢 敗龜板 壹個 服之卽下若無

敗龜板藥鋪內製板亦可

安胎四製香附散

香附末不拘多少初製以童便浸一日一夜連童便
傾入銅鍋內炒乾二製用濃鹽湯浸一日一夜連湯

入銅鍋內炒乾三製用薑汁浸一日一夜連汁入銅
鍋內炒乾四製用陳老酒浸一日一夜連酒入銅鍋
內炒乾存性以銅器研成細末收貯勿使泄氣如遇
胎動用紫蘇湯送藥叁錢卽安

胎動下血方

病痛搶心者用葱白煎濃汁飲之其胎未死卽安已
死卽出未效再服

漏胎下血方

用白茅草根洗淨煎濃汁服下卽止

婦人血崩方

荊芥穗

小茴香

各等分新瓦焙黃爲末每服叁錢溫黃酒下不
論遠近三服卽愈

又方用多年屋上陳稻草壹把切斷鍋內炒焦用生
酒燒滾渣去服酒以汗出爲度卽止如初起時用割
人臍擣汁一杯和酒卽愈

又方

當歸壹兩川芎壹兩升麻伍錢

水煎服

調經方

男子以精固爲安，女人以經調爲健。女子自生日起，至五千四十八日，而天癸至，由是身中血脈周流如地之水脈浸潤。乃一月一經，外應潮候，亦名月汛。婦人女子經脈不行，多有脾胃損傷而經止者，不可便作經閉，輕用破血之劑。須察其脾胃或飲食損傷，中氣以致血少不行，只宜理脾。用白朮爲君，佐以黃芪、甘草、芍藥、歸朮、麥芽等藥，以扶芍爲臣，使脾旺自然生血而經行矣。如脾胃無病，果有血塊，方宜行血。女人

鬱氣最多其治女人諸病以烏藥稱神又香附乃開鬱之聖劑故古人單開醋附丸調理女人極效如胎前產後則益母草最佳安胎以砂仁極效大抵調理女人以四物二陳兩方加減爲主

回生丹 治產後諸病神效無比

錦文大黃

壹斤爲細末

蘇木

叁兩搗碎河水五碗煎叁碗取汁

紅花

叁兩炒黃

色入好酒壹斤煎三五沸取汁用

黑豆

叁斤煮汁叁碗豆皮晒乾爲末

先將大黃末用好酒醋三四碗攪勻以文武火

熬膏如此三遍次下紅花汁蘇木湯黑豆汁攪

勾入大黃膏內又熬成膏如有錫煇焙乾入後

藥內

當歸

川芎

熟地

白茯苓

蒼朮

米泔

水浸

香附

烏藥

元胡

桃仁

另研川牛

膝

蒲黃

以上各

白芍

酒炒

甘草

陳皮

木香

三稜

五靈脂

羌活

各伍錢

山萸肉

伍錢人參

白朮

青皮

木瓜

各伍錢

良薑

肆錢乳香

去油

沒藥

去油各

貳錢

共爲細末以大黃膏丸如彈子大凡遇產後十

八症每用一丸以酒燉化熱服若產後頭痛身
熱無汗謂之傷寒加麻黃末炙川山甲末黃連
末各叁分同入酒內燉服乳頭揉十餘下乳自
湧泉而下此藥治娠婦勞後胎動或胎漏惡露
時下臍膈虛寒久不成胎痿燥不長過期不產
日月雖滿動作無力或致損墮或產時未至惡
露先下胞絡枯燥致令難產或煩燥悶亂連日
不產子死腹中身上未冷口唇青黃黑多出冷
汗惡露上攻昏迷不醒喘促汗出及瘀血未盡

臍冷腹疼寒熱往來或因產勞虛損身羸面黃
體瘦心怯盜汗飲食不進漸成癆疾每日常服
補氣養胎臨產滋陰妙難盡述

婦人白帶方

紅棗 黑豆 白菓

三樣煮食每日空心任食十餘日卽愈

婦人白帶男人白濁神方

硫黃不拘多少用豆腐一大塊中挖一孔將硫黃打
成羅漢豆大填入腐內上仍蓋豆腐或砂鍋或銅鍋

煮豆腐絕無硫黃氣味方好去腐硫黃聽用南白芍
不拘多少用濕紙包煨以上二味各研細末等分麵

糊爲丸如黃豆大前五日每日服伍錢后五日每日
服壹錢清晨淡酒或好黃酒亦可服十日永不再發
神效無比

陰中生瘡方

鯽魚胆塗之立效

蟲食陰戶方

輕則癢重則痛用蛇床子白礬煎湯淋洗卽愈

陰腫痛方

葱白麝香搗和貼腫處乾菊花煎湯薰洗

婦人陰寒無子方

吳茱萸

川椒各壹升

爲末煉蜜丸如彈子大綿裹納陰中一日兩換

使子宮開卽受胎矣

治女子乾血癆唇紅腮白似桃花色骨瘦如柴啄木蟲
壹個瓦焙存性爲末上好酒每樽五分不過十日卽
愈

婦人乾血癆方

漏蓄貳錢 地黃錢半 胡椒壹錢 巴豆伍分 去油 右四味搗

碎新紬貳層包緊札做壹團如棗子樣用新線叁根
捻成索子拴牢在藥包這頭拴在腰帶上令老婦人
將藥包入病人陰戶內三寸許病淺者臭穢出盡見
鮮血下卽愈病深者五七日卽下切忌房事足一百
日並豬肉蕎麥麵其下來之藥用水擺淨乾火炙存
性搗末凡番胃隔者熱火酒調服卽愈

婦科

小兒諸病對症發藥歌

幼小醫家另設科一時要用不知何驚風發熱兼痰
嗽保命丹投不必多未出痘花神異治驚連急慢紫
金磨腹痛吐瀉宜助胃唇口生瘡化毒和發熱變蒸
惺惺散風痰潮熱抱龍托諸疳蘆薈皆通用嘔吐燒
針丸對科痢疾木香清隔飲臍風匝口蝎稍托散名
保命攻驚口即雪夜啼猪乳四君和

視嬰兒脉理歌

三五嬰孩脉未全只憑虎口指頭聞原分左右現男

女寅卯關邊仔細看脉現寅關紋細短輕災易治不
爲難寅關脉起連通卯病勢根深莫小看若透三關
辰位上縱是虛扁難萬全

育兒歌

養子須調護看承莫縱馳乳多終損胃食壅卽傷脾
厚暖非爲益衣單正所宜無風頻見日寒暑順天時
又云若要小兒安常帶三分飢與寒

保命丹 治小兒一切驚風發熱痰嗽

天麻

錢半

防風

粉草

姜蠶

炒去絲

白附子

硃砂

鬱金

各壹錢

麝香

少許

全蝎

壹錢去尾尖

薄荷

青黛

南星

右爲末煉蜜爲丸如皂子大每服壹丸金銀燈

心湯送下

抱龍丸

治小兒痰嗽驚風時作寒熱

牛胆南星

壹兩

天竺黃

伍錢

雄黃

辰硃

各貳錢肆分

香附

壹錢另研

右爲末煉蜜丸如芡實大薄荷湯送下

惺惺散

治發熱發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參 白朮 甘草 桔梗 白茯苓

天花粉 白芍藥 細辛根各等分

水壹鍾煎肆分服

蘆薈丸 治小兒脾胃積潮成疳疾

黃連去鬚 龍胆草 蕪夷

蘆薈去皮先炒黃色再與上二味同炒

右爲末飯飲丸如黍米大小加減空心米湯下

大蘆薈丸 治小兒諸疳疾神效

蘆薈 蕪夷 木香 青黛 川黃連

蟬退 米個 板柳 各等 麝香 少許 胡黃連

右爲末以雄黃猪胆汁浸作糊丸如麻子大每

服三二十丸米湯送下

燒針丸 治小兒胸膈吐逆下注瀉不止者

黃丹 硃砂 枯礬 各等分

右爲末以棗肉丸如豆大每服三四丸鐵針尖

上就清油燈焰上燒過研碎涼米泔水調服下

瀉者台前服

木香清腸飲 治小兒赤白痢

木香

人參

甘草

厚朴

陳皮

茯苓

杏仁

雞蘇

宿砂

麥冬

薑二片棗一枚煎服

蓮肉

白朮

茯苓

山藥

神麴

山楂

人參

猪苓

澤瀉

藿香

木香

當歸

白芍藥

砂仁

肉蔻

陳皮

甘草

各等分

右爲末任意多寡薑湯調服驚風復加辰砂滑

石各貳錢

保命散 治小兒雪口白屑滿口如鷺之白者心脾熱

也用髮纏指頭蘸薄荷自然汁或鴈雪水拭淨

枯凡

硃砂各伍分 馬牙硝貳錢伍分

右爲末每一次取白鷺糞搗水調塗舌上頰頰

內立效

蝎稍散 治一切胎風及百日內匝口臍風

全蝎稍

肆拾玖個每個用薄荷捲定以棉絮之砂鍋內滾炒薄荷乾 酥爲度姜蠶肆拾

片腦

少許麝香少許

右爲末用雄鷄肝貳片煎湯調服卽止又法於

七月內患此者急看兒齒齲之上有小泡如果
子狀急以染青布裹手指蘸溫水輕輕擦破卽
開口安妥不必用藥

猪乳膏 治小兒半夜驚啼掣肘乃胎中受驚所致急
宜用此

琥珀 防風 各壹硃砂伍分

右爲末用猪乳汁調一次抹兒口中極驗

四君子湯 治小兒下半夜驚啼不止乃腰曲內拘手
足抽掣皆虛寒所致也

人參

白朮

茯苓

山藥

扁豆

各參分

右爲末每挑少許於乳頭上令兒吮之如血熱
焦啼用當歸爲末乳汁調一次抹乳與吮亦效
凡小兒生下不能啼者因難產冒寒所致急以棉
絮裹抱懷中未可遽斷臍帶且將胞衣置火灰
中煨之仍點大油紙拈於帶往來遍燎使火氣
由帶而入臍內更以熱湯洗臍帶須臾氣回
啼哭如常方可浴洗然後割臍帶則易養無虞
也

又小兒初生穀道無孔者乃肺熱閉於肛門急用
金銀玉簪看其端的刺穿或用火針亦可然刺
不可深仍以油紙拈條套住如蜜導法內服四
順湯清涼飲免其再合

急救良方

治夢中魘歌

夢中魘死如何救原若無燈勿點燈急以竹筒吹
兩耳鹽湯灌鼻救如神或吹鼻內通關散或滴其
中韭汁靈兼治猝然來中惡卽時起死待回生

救涼舍鬼迷歌

官房涼舍久無人偶睡其中被鬼侵口不能言
聲吃吃若無良藥便沉沉牛黃末子雄黃末再
入硃砂各伍分一半必燒牀榻下酒調一半灌
之靈

治跌傷瘀血冲心垂絕歌

瘀血冲心墜下時淹淹欲絕氣難支豆豉急取
濃煎服續命靈丹怎得知或遇咬牙無氣息急
遺小便灌之宜人能記得仙方去到處施仁賽

國醫

治絞腸痧急痛歌

絞腸痧痛是何如手足如冰陰症虛定有遍身紅
點發燈心點火燎之除若然手足仍溫煖此是陽
沙另法祛十指甲邊針刺遍將將兩臂血漣汝

解諸般菌毒歌

諸般菌毒每傷人其哉令人笑不禁必是此蟲踏
踞處蒸薰毒氣結成根急將淨沙開深坎直見黃
泥抱水傾攪潤澄清吞一碗應知到口便安寧不

然更得芫花末水下錢方效益靈

鮮魚骨鯁喉歌

喉中骨鯁有方傳甘草砂仁共分研爲末裏綿含
咽久骨隨痰出便安然或將金鳳根和子咀嚼噙
之骨是綿稍愈卽將湯漱口慮其傷損牙齒根又
或將硼砂一兩和水噙化更如仙

紫金錠 治小兒驚風神效

人參 茯苓 茯神 辰砂 山藥

乳香 白朮各參 金箔 拾肆片另

上爲末以糕壹兩爲丸薄荷湯磨用

神異丹 治未出痘疹小兒一切驚風發熱痰嗽等

症

全蝎

去尾尖

薄荷

天麻

防風

乾葛

姜蠶

炒去絲

半夏

姜汁炒

南星

姜汁炒

荆芥穗

升麻

芍藥

甘草

川芎

右各等分爲末煉蜜丸如皂角子大每付壹丸

白滾水送下

助胃丹

治小兒吐瀉腹痛

猪苓 澤瀉 茯苓 肉桂 白朮各

錢以上即 蒼朮 陳皮 厚朴 甘草各

五苓散 錢以上平 肉豆蔻 貳錢 通煨

右為末煉蜜為丸如芡實大米湯化下壹錢

五福化毒丹 治小兒唇口腫破生瘡

元參 焙 桔梗 茯苓各貳兩 人參 伍錢 青黛

牙硝各壹兩 甘草 柒分 麝香 錢半 金銀箔各肆拾片 為衣

右為末煉蜜丸如皂角子大用薄荷湯化下口

臭以生地黄調下

治小兒急慢驚風

硃砂

伍厘研末

沒藥

貳厘研末

烏梅

連核燒灰存性研末叁厘

右三味共合成一分刺大人指血一點爲丸

孩子口中用滾水嚥下立愈 藥料每樣用小

瓶收貯臨用方合

治走馬牙疳

胡黃連

冰片

枯礬

各等分爲末泔水洗淨搗上立效

治大人小兒耳膿水

海螵蛸壹錢燒 枯礬壹錢 麝香少許 乾胭脂分

共爲末吹入耳內卽愈

治喉風舌大如脖卽時不救必死

冰片壹分 火硝 胆礬 蜈蚣各貳分 姜糖分

硼砂叁分

共爲末吹入口中卽愈

舌腫神方

用皂礬不拘多少以新瓦火煨紅色地上放冷研細揷上其舌卽消

洗眼復明神方

桑白皮 壹兩燒炭存性

水一鍾煎至八分去渣洗眼至一年勝如童子
此方神效無比宜廣傳與人

腳氣痛方

紫參 伍錢

當歸

桂皮

木瓜

茵陳

桂花

燈草

牛膝

防風

荊芥

升麻

五加皮

甘草

各壹錢

右藥用燒酒二斤水煮一個時辰埋土內七日

每日空心服

脚氣衝心神效方

白礬叁兩煎水浸洗兩足良久即愈

治疥瘡膿瘻冥瘡

雄黃

花椒

皂角末

黃瓜藤

五倍子

食松油

真菜油

右藥各等分研極細末抹瘡上三四次全愈

八厘散

治跌打損傷瘀血攻心將死之症灌藥即

醒

土龍去足貳個 生半夏壹錢 乳香去油壹錢 沒藥去油壹錢

自然銅煨壹錢 血竭 歸尾 硼砂各壹錢

骨碎補煨去毛壹錢

右藥共研細末磁罐收貯每服八厘用好酒送

下

打傷將死神方 又治痛風如神

用白頭蚯蚓去泥洗淨焙乾為末每服貳錢薑葱

湯調服發汗即愈

白丸方 治一切胃痛 中暑 霍亂 吐瀉

絞腸沙 腹痛 紅白痢疾 中溫卒然昏昧

大鹽用砂鍋文武火炒胡椒揀去批小者透明白

礬放小砂鍋內入大火中飛透

砂仁去壳爭用仁微炒秤准貳兩

右四味共為細末用蕎麥麵打糊為丸如桐子

大每服十叁丸或玖丸小兒量減減之用薑湯

送下如在途中用小便送下亦可忌生冷等物

為要

藥酒方

公丁香

肉苁

白豆蔻

去壳

高良薑

薄荷

各伍錢

紅麴

貳兩

白糖

半斤

原封燒酒十五斤用鍋隔水點火用活柳枝頻攪
火高半尺爲度裝入瓶內隨時可飲

治痢奇妙方

痢爲險惡之症生死所關不惟醫治者之多失宜
而古今治法亦多不得其道是以不能速效今立
方何以爲奇不泥成法故奇也立論何以爲妙不
謬成說故妙也然其藥品又不外乎常用而已有

識者切不可更張遵而行之無不效驗也

痢疾初起煎方

川黃連

去芦

條黃芩

壹錢叁分

白芍

壹錢貳分

陳枳壳

去穢捌分

山查肉

壹錢叁分

紫厚朴

去皮薑汁拌炒捌分

厚青皮

去穢捌分

板榔

洲分

當歸伍分

地榆

伍分

紅花

叁分

桃仁

壹錢

去皮研如泥

木香

貳分

甘草

伍分

右咀片如法炮製水貳碗煎壹碗空心服渣再

煎服此方或紅或白裡急后重身熱腹痛者俱

可服如單白者去地榆桃仁加橘紅蘇木香

如滯澁甚者加大黃貳錢用酒拌炒服一二劑
仍除之若一劑滯已去者不必又用二劑矣大
黃于年幼衰弱之人又不可拘用貳錢也

右方用之三五日內神效旬日內亦效惟十日
半月外則當加減矣另詳于左

加減煎方

川黃連酒炒貳分條黃芩酒炒陸分大紅芍藥酒炒

陸分生山查肉壹錢廣橘紅肆分厚青皮肆分

堅栝榔肆分甘草生壹分當歸伍分地榆肆分桃仁泥

貳分 木香 肆分 紅花 叁分

右咀片如法炮製水貳碗煎壹碗空心服渣再煎服延至月餘覺脾胃熱而虛滑者法當補理方具于左

補理煎方

川黃連 酒炒 條黃芩 酒炒 白芍 酒炒 廣橘紅 陸分
當歸 伍分 人參 伍分 白朮 肆分 炙甘草 各伍分

右咀片如法炮製水煎服渣再煎服如婦人痢疾有胎者去桃仁紅花

以上三方隨用卽效其不效者必初時投參朮等
補藥太早補塞邪氣在內而正氣已虛邪氣益盛
纏綿不已欲補而勝之則助邪欲清而疏之則愈
清遂至不可救藥雖有奇方無如之何是初投溫
補殺之也

稀痘神驗方

大麻子

去壳取油揀肥白者叁拾陸粒

硃砂

壹錢研細末須透紅劈砂爲妙

上真麝香

伍厘

先將硃砂麝香二味共爲細末然後入大麻子

共一處研極細成膏于端午午時搽小兒頭頂
心前後心兩手足心兩膀灣兩腿灣兩腋窩共
拾叁處俱要搽到勿使藥有餘剩搽如錢大搽
後不可洗動待其自落本年搽過一次出痘一
二粒至次年端午午時再搽一次痘永不出如
未過一生小兒于七月七日九月九日依法搽
之更妙傳方之家已十六代不出
誠保赤靈丹也